

Diazepam (diazepam, Stesolid)

Toedieningsvormen

Tabletten, rectiolen (kleine klysma's), injectie

Toepassing

Diazepam is geregistreerd als rustgevend middel, als slaapmiddel, bij epilepsie, spierkramp, wondkramp (tetanus), koortsstuipen bij kinderen, acute onthoudingsverschijnselen na staken van alcoholgebruik en zwangerschapsvergiftiging. Artsen schrijven het ook voor bij dystonie.

Werking

Diazepam remt de zenuwbanen in het ruggenmerg en hersenen waardoor verkrampte spieren verslappen.

Bijwerkingen

Vooraf in het begin sufheid, slaperigheid, spierslapte, hoofdpijn, duizeligheid en dubbelzien. Vaak neemt dit na één tot twee weken af. Bij kinderen en ouderen kunnen soms rusteloosheid, prikkelbaarheid, agressief gedrag en nachtmerries ontstaan.

Bijzonderheden

- Alcohol en diazepam versterken elkaars versuffende effect. Dit geldt ook voor andere middelen die versuffend werken.
- Omdat diazepam langdurig werkt, heeft het ook een langdurige invloed op de rijvaardigheid. U mag 72 uur na inname niet autorijden.
- Veel mensen kennen diazepam als 'Valium'. Tegenwoordig is diazepam niet meer onder deze merknaam verkrijgbaar.