

Levodopa/benserazide (levodopa/benserazide, Madopar)

Levodopa/carbidopa (Duodopa, levodopa/carbidopa, Sinemet)

Toedieningsvormen

Capsules, gel, tabletten

Toepassing

Deze middelen zijn geregistreerd voor de ziekte van Parkinson. Artsen schrijven ze ook voor bij rusteloze benen (restless legs) en een speciale vorm van dystonie, namelijk de dopa-responsieve dystonie (DRD). Bij andere vormen van dystonie kan Levodopa soms een positieve bijdrage leveren.

Werking

Levodopa wordt in de hersenen omgezet in dopamine. De middelen benserazide en carbidopa zijn hulpstoffen die ervoor zorgen dat het levodopa niet vroegtijdig door het lichaam wordt afgebroken.

Bijwerkingen

Ongewilde bewegingen kunnen zowel vroeg als laat in de behandeling optreden en zijn afhankelijk van de dosis. Verder komen vooral in het begin maagdarmklachten en duizeligheid voor en soms slaapstoornissen, verwardheid, hallucinaties en andere bewegingsstoornissen zoals stijfheid of 'op slot' zitten van de spieren.

Bijzonderheden

- IJzerpreparaten beïnvloeden de opname van levodopa en moet u met een tussenpauze van minstens twee uur van elkaar innemen.
- Bij een eiwitrijk dieet kan de opname verstoord raken. Vermijd daarom eiwitrijke producten.
- Levodopa mag niet tegelijk met antidepressiva van het MAO-remmertype worden gebruikt, zoals moclobemide (Aurorix). Na stoppen van de antidepressiva moet u nog twee weken wachten voordat u levodopa mag gebruiken.
- Levodopa beïnvloedt de rijvaardigheid. U mag de eerste dagen dat u het gebruikt niet autorijden. Alcohol of andere medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden versterken dit effect.
- U moet het gebruik langzaam, in overleg met de arts, afbouwen.