

## ***Pimozide (Orap)***

### **Toedieningsvorm**

Tabletten

### **Toepassing**

Pimozide is geregistreerd voor psychosen. Artsen schrijven het ook voor bij schizofrenie, tics en onrust bij autisme. Het wordt ook bij jonge patiënten met gegeneraliseerde dystonie toegepast, soms in combinatie met haloperidol.

### **Werking**

Het vermindert het effect van dopamine in de hersenen.

### **Bijwerkingen**

Bewegingsstoornissen komen vaak voor. Verder vooral in het begin slaperigheid, sufheid, duizeligheid, onverschilligheid, droge mond, wazig zien, verstopping, moeite met plassen. Zeer zelden: ernstige hartritmestoornissen.

### **Bijzonderheden**

- Het middel beïnvloedt de rijvaardigheid. U mag de eerste dagen dat u het gebruikt niet autorijden. Alcohol of andere medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden versterken dit effect.
- Ouderen hebben meer last van bijwerkingen.
- Eet geen grapefruits en drink geen grapefruitsap zolang u pimozide gebruikt: grapefruit vergroot de kans op bijwerkingen.
- Verschillende medicijnen, waaronder bepaalde antibiotica, vergroten de kans op hartritmestoornissen door pimozide.