

Trihexyfenidyl (Artane)

Toedieningsvorm

Tabletten

Toepassing

Het is geregistreerd voor van de ziekte van Parkinson, varianten van deze ziekte en andere bewegingsstoornissen die hier op lijken, bijvoorbeeld veroorzaakt door het gebruik van medicijnen (zoals bepaalde middelen tegen psychose). Artsen schrijven het ook voor bij dystonie.

Werking

Trihexyfenidyl vermindert de werking van acetylcholine, een boodschapperstof in de hersenen. Het verbetert in de hersenen het verstoorde evenwicht tussen de verschillende boodschapperstoffen zoals dopamine en acetylcholine.

Bijwerkingen

Droge mond, moeite met lezen, moeite met plassen, misselijkheid, verstopping, en vooral bij ouderen geheugenstoornissen en verwardheid.

Bijzonderheden:

- De dosering wordt geleidelijk verhoogd. Meestal is de maximale dosis nodig en moet deze enkele maanden gebruikt worden voor het effect merkbaar wordt. U moet het gebruik ook langzaam afbouwen, in overleg met de arts.
- Jonge dystoniepatiënten lijken beter te reageren dan oudere.
- Het middel beïnvloedt de rijvaardigheid. U mag de eerste dagen dat u het gebruikt niet autorijden. Alcohol of andere medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden versterken dit effect.